

| レジメン名 | 催吐リスク |
|-----------|-------|
| 乳がん GEM療法 | 軽度 |

| | |
|------|----------------------------------|
| 適応 | 切除不能な進行・再発の 乳がん（三次治療以降） |
| 投与期間 | 週1回投与2週間、3週目休薬を1コースとして、不応になるまで継続 |

| | 薬品名 | 投与量 | 投与ルート | 投与時間 | 備考 |
|---|---|------------------------|-------|------|----|
| ① | グラニセトンバッグ 3mg(1mgでも可) +デカドロン注6.6mg 1~2V | | 点滴 | 30分 | |
| ② | ゲムシタビン (GEM) 生食100mL | 1,250mg/m ² | 点滴 | 30分 | |
| | | | | | |

投与スケジュール

| 薬品名 | Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ゲムシタビン | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | 休 | | | | | | |

Day1 or 8

①グラニセトン+デカドロン 30分

②ゲムシタビン 30分

減量規定及び中止基準

Grade4以上の有害事象、Grade3以上の血液毒性出現時、80%dose down、または中止