

レジメン名	催吐リスク
胃がん IRI-S	中等度

適応	切除不能な進行・再発の 胃がん 三次治療以降				
投与期間	5週間を1コースとして、不応になるまで継続				
①	薬品名	投与量	投与ルート	投与時間	備考
①	グラニセロンバッグ [®] 3mg(1mgでも可) +デカドロン注6.6mg 1~2V		点滴	30分	day1、15
②	イリノテカン (CPT-11) 生食500mL	80mg/m ²	点滴	90分	
③	S-1	※下記参照	内服		day1~21

※ S-1投与量

体表面積

用量

1.25m ² 未満	40mg/回 × 2回/日
1.25~1.5m ²	50mg/回 × 2回/日
1.5m ² 以上	60mg/回 × 2回/日

投与スケジュール

薬品名	Day	1	2	...	14	15	16	17	...	21	22	...	27	28	29	...	34	35	
イリノテカン		↓				↓					2週間休薬								
S-1		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓									

Day1 or 15

- ①グラニセロン+デカドロン (30分)
- ②イリノテカン 90分

③TS-1 3週間内服

減量規定及び中止基準

grade4以上の有害事象、grade3以上の血液毒性出現時
80% dose down 又は中止