

レジメン名	催吐リスク
胃がん SOX	中等度

適応	切除不能な進行・再発の 胃がん 一次治療				
投与期間	3週間を1コースとして、不応になるまで継続				
	薬品名	投与量	投与ルート	投与時間	備考
①	グラニセトロンバッグ [®] 3mg(1mgでも可) +デカドロン注6.6mg 1~2V		点滴	30分	
②	エルプラット (L-OHP) 5%ブドウ糖液250mL	100 又は 130mg/m ² ※	点滴	2時間	
③	TS-1	※下記用量	内服	2週間服用 1週間休薬	Day1の夕食後 から開始

※1 林ガリアン投与量：G-SOX試験では100mg/m² HIGH-SOX試験(SOX+T-mab)では130mg/m²

※ TS-1投与量

体表面積	用量
1.25m ² 未満	40mg/回 × 2回/日
1.25~1.5m ²	50mg/回 × 2回/日
1.5m ² 以上	60mg/回 × 2回/日

投与スケジュール

薬品名	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
エルプラット		↓																					
TS-1		↓ 夕	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓ 朝	休薬						

Day1

① グラニセトロン+デカドロン 30分

② エルプラット 2時間

③ TS-1 Day1夕~Day15朝まで

減量規定及び中止基準

Grade 3 以上で減量

オキサリプラチン 1回目発現時：75mg/m²に減量
2回目発現時：50mg/m²に減量