

レジメン名	催吐リスク
胆道がん GEM + CDDP	中等度

適応	切除不能な進行・再発の 胆道がん 一次治療				
投与期間	3週間を1コースとして、不応になるまで継続				
	薬品名	投与量	投与ルート	投与時間	備考
①	生食500mL	2～3袋	点滴	3～4.5時間	主管から
②	パロノセトロンバッグ0.75mg + デカドロン注6.6mg 1～2V		点滴	15分	側管から
③	シスプラチン (CDDP) 生食250mL	25mg/m ²	点滴	60分	
④	ゲムシタビン (GEM) 生食100mL	1000mg/m ²	点滴	30分	
⑤	D-マンニトール注射液20%	300mL	点滴 (必要に応じて追加)	30分	

投与スケジュール

薬品名	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		↓							↓							休 薬							
ゲムシタビン		↓							↓														

Day1 or 8

主管	①生食500mL 2～3袋 (3～4.5時間)
側管	②パロノセトロン+デカドロン 15分
	③シスプラチン 60分
	④ゲムシタビン 30分
	⑤D-マンニトール 30分 (必要に応じて)

減量規定及び中止基準

Grade4 以上の有害事象、Grade3 以上の血液毒性出現時、80% dose down、または中止