

レジメン名	催吐リスク
胆道がん GS(GEM+S-1)療法	軽度

適応	切除不能な進行・再発の 膵臓・胆道がん 1次治療				
投与期間	GEM:週1回投与2週間、3週目休薬、S-1:14日間服用、7日間休薬を1コースとして、不応になるまで継続				
	薬品名	投与量	投与ルート	投与時間	備考
①	グラニセトロンバッグ [®] 3mg(1mgでも可) +デカドロン注6.6mg 1~2V		点滴	30分	
②	ゲムシタビン (GEM) 生食100mL	1000mg/m ²	点滴	30分	Day1,8
③	S - 1	※下記用量	内服	14日間服用 7日間休薬	Day1の夕食後から開始

※ S-1投与量

体表面積

用量

1.25m ² 未満	30mg/回 × 2回/日
1.25~1.5m ²	40mg/回 × 2回/日
1.5m ² 以上	50mg/回 × 2回/日

●他がん腫の際とS-1の投与量が異なるので注意！

投与スケジュール

薬品名	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	...	21
ゲムシタビン		↓							↓							休			
S-1		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓				休薬

Day1 or 8

①グラニセトロン+デカドロン 30分

②ゲムシタビン 30分

減量規定及び中止基準

Grade4以上の有害事象、Grade3以上の血液毒性出現時、80%dose down、または中止